



Obszar chorobowy	Wiek / grupa	Refundacja / finansowanie	Kiedy należy się zaszczepić?	Uwagi
Grypa (szczepionka standardowa)	dzieci od 6 mies. do 17 lat	bezpłatnie	co sezon , najlepiej przed wzrostem zachorowań; optymalnie jesienią	U części dzieci <9 lat szczepionych po raz pierwszy potrzebne są 2 dawki w odstępie ≥4 tygodni.
	18–64 lata	50% refundacji	co sezon , najlepiej przed sezonem infekcyjnym	Szczepienie można wykonać również w trakcie sezonu.
	kobiety w ciąży i połogu	bezpłatnie	w dowolnym trymestrze , w każdym sezonie grypowym	Chroni kobietę przed ciężkim przebiegiem grypy; szczepienie w ciąży daje również korzyści dziecku.
	65+	bezpłatnie	co sezon	Seniorzy należą do grup szczególnie narażonych na ciężki przebieg i powikłania.
Grypa (szczepionka wysokodawkowa)	60+	50% refundacji	co sezon	Szczepionka o zwiększonej zawartości antygeny, rekomendowana starszym dorosłym; eksperci postulują o bezpłatny dostęp dla 65+.
Pneumokoki	niemowlęta i dzieci objęte PSO	bezpłatnie (szczepienie obowiązkowe)	standardowo 2. i 4. mies. życia + dawka uzupełniająca w 13.–15. mies. Dzieci z grup ryzyka- jak najszybciej po ustaleniu z lekarzem	Eksperci postulują dostosowywanie preparatów w PSO do aktualnej epidemiologii.
	65+ ze zwiększonym ryzykiem choroby pneumokokowej	PCV13- bezpłatnie w wybranych grupach ryzyka PCV20 i PCV21- brak powszechnej refundacji	szczepienie nie jest sezonowe – można wykonać je przez cały rok	Szczepienie całoroczne, przed sezonem infekcyjnym także w koadministracji ze szczepieniem przeciw grypie
RSV (przeciwciała monoklonalne)	noworodki i niemowlęta	brak powszechnej refundacji	przed lub na początku pierwszego sezonu RSV	AOTMiT wydała w 2026 r. pozytywne rekomendacje refundacyjne w ocenianych wskazaniach. Eksperci postulują powszechny dostęp.
RSV	kobiety w ciąży	bezpłatnie	24.–36. tydzień ciąży	Celem jest bierna ochrona niemowlęcia przed ciężkim RSV w pierwszych miesiącach życia.
	60–64 lata	50% refundacji	szczepienie najlepiej zaplanować przed sezonem RSV	Szczepienie całoroczne, przed sezonem infekcyjnym także w koadministracji ze szczepieniem przeciw grypie
	65+	bezpłatnie	najlepiej przed sezonem RSV	
HPV	dziewczęta i chłopcy w wieku od 9 do 14 lat	bezpłatnie w ramach Powszechnego Programu Szczepień przeciw HPV	najlepiej przed potencjalnym kontaktem z HPV ; 2 dawki w odstępie 6–12 mies.	Szczepienie można realizować w POZ, a także w szkołach uczestniczących w programie .
Krztusiec	kobiety w ciąży	bezpłatnie	27.–36. tydzień każdej ciąży ; przy ryzyku porodu przedwczesnego od 20. tygodnia	Szczepienie matki chroni noworodka w pierwszych miesiącach życia. Nie jest potrzebna recepta.
COVID-19	Na moment przygotowania materiału oczekujemy na komunikat MZ dotyczący organizacji sezonu 2026/2027			



OGÓLNOPOLSKI PROGRAM
ZWALCZANIA CHOROÓB INFEKCYJNYCH
